

BOLETIM 
ItabirAR

AGOSTO | 2023

O boletim mensal informativo do monitoramento da qualidade do ar em Itabira é fruto de um projeto de extensão entre o Instituto de Ciências Puras e Aplicadas (ICPA) da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) Campus Itabira e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente com o objetivo de tornar a análise da qualidade do ar, associada aos fatores meteorológicos, facilmente compreensível à população. Dessa forma, estes boletins, se propõem a auxiliar na efetividade da gestão da qualidade do ar na cidade, além de promover o acesso à informação em matéria ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população em Itabira.



Este boletim contém o detalhamento mensal das condições atmosféricas observadas nos últimos 31 dias do mês de agosto de 2023 para o município de Itabira-MG. Todas as análises aqui contidas foram feitas a partir dos dados da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar de Itabira, mantida pela Vale S.A.

Responsáveis

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itabira:

Alef Soares Ferreira

Diego José Rodrigues Pimenta

Fernanda Paula Bicalho Pio

Responsáveis

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI):

Ana Carolina Vasques Freitas

Jaqueline Natiele Pereira

Júlia Marins Rocha

Lúcio Lino da Silva Filho

Rodolfo Montalvão

Tárik Silveira Cordeiro

Thais Sthefani Drumond Vieira

Criação e Diagramação

Coordenadoria de Comunicação - Prefeitura Municipal de Itabira

SUMÁRIO

01	Introdução	6
02	Índice de Qualidade do Ar	10
03	Focos Mensais de Queimadas	13
04	Condições Meteorológicas	14
05	Análise dos Poluentes Monitorados - $MP_{2,5}$	18
06	Análise dos Poluentes Monitorados - MP_{10}	24
07	Análise dos Poluentes Monitorados - PTS	26
08	Informações Adicionais	28
	14 de agosto: Dia do controle da poluição industrial	
	Referências	30

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Estações Automáticas de Monitoramento do Ar (EAMA) em Itabira	7
Figura 2	Localização das estações de monitoramento da qualidade do ar de Itabira.	8
Figura 3	Classificação do Índice de Qualidade do Ar (IQAR)	10
Figura 4	Focos de queimadas no município e localização das estações de monitoramento	13
Figura 5	Anomalia de precipitação para o mês de agosto	15
Figura 6	Umidade relativa (%) em Itabira para o mês de agosto	16
Figura 7	Rosa dos ventos em Itabira para o mês de agosto	17
Figura 8	Concentração ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) do $\text{MP}_{2,5}$ para as 4 estações de monitoramento em Itabira, de 1 a 31 de agosto de 2023	19
Figura 9	Rosa de poluentes para o $\text{MP}_{2,5}$ na EAMA11 em agosto de 2023	20
Figura 10	Rosa de poluentes para o $\text{MP}_{2,5}$ na EAMA21 em agosto de 2023	21
Figura 11	Rosa de poluentes para o $\text{MP}_{2,5}$ na EAMA31 em agosto de 2023	22
Figura 12	Rosa de poluentes para o $\text{MP}_{2,5}$ na EAMA41 em agosto de 2023	23
Figura 13	Concentração ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) do MP_{10} para as 4 estações de monitoramento em Itabira, de 1 a 31 de agosto	25
Figura 14	Concentração ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) do PTS para as 4 estações de monitoramento em Itabira, de de 1 a 31 de agosto	27
Figura 15	Vista da cidade de Itabira com destaque para as emissões de poeira provenientes das atividades de mineração	28

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	Resumo da classificação da qualidade do ar no mês de agosto de 2023	11
Quadro 2	Classificação da qualidade do ar e possíveis efeitos à saúde	12
Quadro 3	Resumo das medições do parâmetro MP _{2,5} para o mês de agosto de 2023	18
Quadro 4	Resumo das medições do parâmetro MP ₁₀ para o mês de agosto de 2023	24
Quadro 5	Resumo das medições do parâmetro PTS para o mês de agosto de 2023	26
Quadro 6	Padrões de qualidade do ar adotados no município de Itabira	29

INTRODUÇÃO

A Resolução nº 491 de 2018 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) define poluente atmosférico como “qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, tempo ou outras características, que tornem ou possam tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade ou às atividades normais da comunidade”.

Os poluentes podem ser classificados como primários ou secundários. Os primários são aqueles emitidos diretamente pelas fontes, enquanto os secundários são formados na atmosfera por meio de reações químicas entre os poluentes emitidos e/ou os constituintes naturalmente presentes na atmosfera. Já as fontes de poluição podem ser classificadas como fixas, móveis ou fugitivas. As fontes fixas, como as indústrias, liberam os poluentes a partir de um local específico, enquanto que as fontes móveis, como os veículos, estão em movimento. Finalmente, as fontes fugitivas são emissões não intencionais provenientes de vazamentos de tubulações e outras liberações involuntárias difíceis de controlar.

Cada local tem suas fontes particulares de poluição e, portanto, os poluentes a serem monitorados devem ser determinados em cada cidade a partir da realização de um inventário de emissões atmosféricas, que nada mais é do que um levantamento para identificar, caracterizar e quantificar as contribuições dos poluentes emitidos por cada uma das fontes emissoras.

A qualidade do ar pode mudar devido às condições meteorológicas, que podem promover uma maior ou menor diluição dos poluentes. Por isso, normalmente, no período de inverno, a qualidade do ar piora com relação a maior parte dos poluentes, pois as condições meteorológicas neste período não são favoráveis para a dispersão dos poluentes.

Itabira possui uma Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar, implementada e mantida pela Vale S.A. Esta rede é composta de 5 estações, sendo uma Estação Meteorológica (EM11). Cada uma das restantes é denominada de Estação Automática de Monitoramento do Ar (EAMA).

A localização das estações é indicada nos itens a seguir e na Figura 2.

- EAMA11: bairro Vila Paciência;
- EAMA21: praça do bairro Areão;
- EAMA31: bairro João XXIII;
- EAMA41: bairro São Marcos, dentro da escola estadual PREMEN; e
- Em11: Pousada dos Pinheiros no bairro Campestre.


Figura 1. Estações Automáticas de Monitoramento do Ar (EAMA) em Itabira



Fonte: Autores deste trabalho.

A localização das estações é apresentada na Figura 2. O monitoramento é contínuo, com geração de médias horárias durante 24h por dia, por meio dos amostradores em tempo real da *Rupprecht & Patashnick Série 1400a*. Estes amostradores são aprovados pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (*U.S. Environmental Protection Agency - USEPA*) para o monitoramento de material particulado.

Figura 2. Localização das estações de monitoramento da qualidade do ar de Itabira.



Fonte: Autores deste trabalho.

Em Itabira são monitorados os seguintes poluentes:

- **PTS:** Partículas totais em suspensão que representam a soma de todo o material particulado com diâmetro inferior a 50 μm ;
- **MP₁₀:** Partículas inaláveis grossas com diâmetro aerodinâmico médio inferior a 10 μm ;
- **MP_{2,5}:** Partículas respiráveis finas com diâmetro aerodinâmico médio inferior a 2,5 μm .


O material particulado é constituído de partículas de material sólido ou líquido suspensas no ar na forma de poeira, neblina, aerossol, fumaça, fuligem, entre outros (BRASIL, 2018). Ao ser inalado, esse material pode se acumular nas vias respiratórias e intensificar os problemas respiratórios, podendo este efeito ser ainda agravado dependendo da composição química do material inalado (FREITAS e SOLCI, 2009). No caso do material particulado com diâmetro aerodinâmico médio inferior a 2,5 μm (MP_{2,5}), devido à pequena dimensão destas partículas, elas podem penetrar profundamente no sistema respiratório e atingir os alvéolos pulmonares, sendo esta uma região do organismo onde os mecanismos de expulsão dos poluentes não são eficientes (FREITAS e SOLCI, 2009).

O tempo de permanência do material particulado no ar depende do diâmetro da partícula; quanto menor o diâmetro, maior o tempo de permanência. Assim, as partículas grossas visíveis a olho nu (com diâmetro médio acima de 100 μm) tendem a sedimentar rapidamente próximo a fonte emissora e, por isso, são denominadas de partículas sedimentáveis (PS). Estas partículas, de modo geral, não causam problemas para o sistema respiratório, pois não são inaláveis, mas causam incômodos constantes à população por conta da sujeira. Assim, deve-se ressaltar, que a rede de monitoramento de Itabira atualmente mede as partículas que estão em suspensão no ar (PTS, MP₁₀ e MP_{2,5}), seguindo a Resolução CONAMA nº491 de 2018. Estas partículas são invisíveis a olho nu, mas causam a dispersão da luz, podendo este efeito ser visto na atmosfera em termos de redução da visibilidade. Quanto maior o diâmetro da partícula, maior será a dispersão da luz.

ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR

O Índice de Qualidade do Ar (IQAr) consiste em uma equação matemática, definida pela Resolução nº 491, de 19 de novembro de 2018, e representa um “valor utilizado para fins de comunicação e informação à população que relaciona as concentrações dos poluentes monitorados aos possíveis efeitos adversos à saúde” (BRASIL, 2018). Este índice simplifica a interpretação dos dados de concentração dos poluentes atmosféricos monitorados e avalia a qualidade do ar em diferentes categorias, que são associadas aos seus efeitos sobre a saúde. A partir do cálculo do IQAr para cada poluente é atribuída uma classificação que compreende as seguintes categorias: Boa, Moderada, Ruim, Muito Ruim e Péssima; sendo cada uma delas relacionada a uma cor e uma faixa de valores, conforme a Figura 3. Embora o índice seja calculado para cada poluente, a classificação final é determinada pelo índice mais elevado, que representa a pior situação.

Figura 3. Classificação do Índice de Qualidade do Ar (IQAR).



A seguir, apresenta-se um Quadro Resumo (Quadro 1) dos resultados para o IQAr final obtidos por meio do cálculo do índice a partir dos dois poluentes monitorados (MP₁₀ e MP_{2,5}) no mês de agosto de 2023. Este resumo apresenta, em termos percentuais, o número de períodos de 24 horas em que a qualidade do ar apresentou classificação “boa”, “moderada”, “ruim”, “muito ruim” ou “péssima”. No caso de falhas na medição, esta porcentagem é classificada no Quadro Resumo como “Sem representatividade mensal”, quando mais de uma estação não atender o critério de representatividade temporal em um ou mais parâmetros.

Quadro 1. Resumo da classificação da qualidade do ar no mês de agosto de 2023.

Quadro Resumo IQAR

Índice	Qualidade	Resumo do Período (%)
0 - 40	N1 Boa	84,07
41 - 80	N2 Moderada	11,16
81 - 120	N3 Ruim	0
121 - 200	N4 Muito Ruim	0
> 200	N5 Péssima	0
Sem representatividade mensal		4,77

Observa-se que 84,07% das medições do mês de agosto resultaram em uma qualidade do ar considerada como BOA, 11,16% MODERADA e 4,77% dos valores não tiveram representatividade mensal.

Os possíveis efeitos à saúde, associados a cada categoria do índice, são descritos a seguir.

Quadro 2. Classificação da qualidade do ar e possíveis efeitos à saúde.

Índice	Qualidade	Possíveis Efeitos à Saúde
N1 Boa	0 - 40	
N2 Moderada	41 - 80	Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população, em geral, não é afetada.
N3 Ruim	81 - 120	Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar efeitos mais sérios na saúde.
N4 Muito Ruim	121 - 200	Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda falta de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas).
N5 Péssima	> 200	Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis.


Fonte: Cetesb.

FOCOS MENSAIS DE QUEIMADAS

De acordo com os dados do monitoramento do Programa Queimadas do INPE (www.inpe.br/queimadas) no mês de agosto de 2023 foram detectados dentro da área do município 4 focos nos dias 04, 11 e 16, sendo esse último com dois registros (Figura 4).

O Programa Queimadas do INPE utiliza cerca de 200 imagens por dia, recebidas de dez satélites diferentes. Contudo, para a finalidade deste boletim, foram utilizadas as imagens do satélite NPP-375.

Figura 4. Focos de queimadas no município e localização das estações de monitoramento.



Cabe ressaltar que os satélites detectam focos maiores, sendo assim, o mapa apresentado na Figura 4 não contempla os focos menores, principalmente aqueles que ocorrem em área urbana.

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS


É importante estar ciente das condições meteorológicas, pois elas podem alterar a qualidade do ar, mesmo quando a emissão de poluentes é constante (GOMES, 2012). De acordo com a classificação climática de Köppen, Itabira se classifica como Cwa (KÖPPEN, 2022). Essa classificação se caracteriza por: climas úmidos de latitudes médias com invernos amenos e secos, e verões longos, muito quentes e úmidos.

Anomalias na precipitação, por exemplo, podem afetar os dados da qualidade do ar, e assim, a emissão de particulados precisa ser analisada considerando a ocorrência ou não de chuva, uma vez que esta promove a remoção de poluentes na atmosfera.

Já as altas temperaturas, predominantes no verão, facilitam a instabilidade da atmosfera e os movimentos verticais ascendentes (por fatores convectivos), elevando os poluentes emitidos e dispersando-os (VICENTINI, 2011). Por outro lado, durante o inverno, a temperatura mais baixa favorece a estabilidade da atmosfera e os poluentes tendem a se manterem próximos à superfície, piorando a qualidade do ar. A radiação solar, mais intensa durante o verão, também influencia a qualidade do ar, pois favorece a formação de poluentes secundários (VICENTINI, 2011).


A Figura 5 apresenta a precipitação diária e a temperatura em Itabira para o mês de agosto por meio dos dados da estação meteorológica da rede de monitoramento da qualidade do ar (EM11). O total acumulado de chuva neste período foi de 42,9 mm. A temperatura média para o mês foi de 20,1°C e a velocidade média do vento foi igual a 2,6 m/s.

Figura 5. Precipitação diária (mm) e temperatura (°C) em Itabira para o mês de agosto.



A umidade relativa do ar média foi de **64,6%** e a variação diária está representada na Figura 6, onde se pode verificar que o menor valor da umidade relativa (UR) mínima diária em todo o período ocorreu no dia 03/08 (20,8%), valor inferior ao Estado de Atenção (30%), de acordo com as faixas críticas consideradas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Salienta-se que, quanto menor o valor de umidade relativa, pior a qualidade do ar.

Figura 6. Umidade relativa (%) em Itabira para o mês de agosto.




A partir dos dados horários de direção e velocidade escalar do vento, obtidos por meio da EM11, é possível obter o mapa da rosa dos ventos que apresenta a direção predominante do vento em Itabira para o mês de agosto (Figura 7).

No mapa de rosa dos ventos os pontos cardeais são: Norte (N), Sul (S), Leste (E), Oeste (W). Os pontos colaterais ficam entre os pontos cardeais e são: Nordeste (NE), entre o Norte e o Leste; Sudeste (SE), entre o Sul e o Leste; Sudoeste (SW), entre o Sul e o Oeste; Noroeste (NW), entre o Norte e o Oeste. Finalmente, os pontos subcolaterais estão entre os pontos cardeais e os pontos colaterais e são: NNE: nor-nordeste - entre o norte (N) e o nordeste (NE); ENE: léis-nordeste - entre o leste (E) e o nordeste (NE); ESE: léis-sudeste - entre o leste (E) e o sudeste (SE); SSE: sul-sudeste - entre o sul (S) e o sudeste (SE); SSW: sul-sudoeste - entre o sul (S) e o sudoeste (SW); WSW: oés-sudoeste - entre o oeste (W) e o sudoeste (SW); WNW: oés-noroeste - entre o oeste (W) e o noroeste (NW); NNW: nor-noroeste - entre o norte (N) e o noroeste (NW).

Conforme pode-se notar na Figura 7, as direções predominantes dos ventos neste período foram de nordeste (NE) e léis-nordeste (ENE). Para o mês de agosto, a estação meteorológica EM11 registrou velocidades horárias do vento variando entre 0,4 m/s, tendo 3 ocorrências (a primeira em 02/08 e a última em 22/08), e 7,6 m/s, no dia 18/08.

Figura 7. Rosa dos ventos em Itabira para o mês de agosto de 2023.



ANÁLISE DOS POLUENTES MONITORADOS - MP_{2,5}


O parâmetro MP_{2,5} apresentou valor máximo de 26,5 µg/m³ no dia 26/08 na EAMA21 e valor mínimo de 2,4 µg/m³ na EAMA41 no dia 28/08. No Quadro 3 apresenta-se um resumo dos valores das medições para o parâmetro MP_{2,5} no período analisado. As maiores concentrações do poluente foram registradas no dia 26/08, enquanto as menores ocorreram nos dias 18, 28 e 29/08.

Quadro 3. Resumo das medições do parâmetro MP_{2,5} para o mês de agosto de 2023.

Estação	Valor Limite PI - 1 (µg/m ³)	Mínimo		Máximo		Média Aritmética (µg/m ³)
		Valor (µg/m ³)	Data	Valor (µg/m ³)	Data	
EAMA 11 Chacrinha	50	4,5	18/08	21,7	26/08	11,0
EAMA 21 Areão		5,9	28/08	26,5	26/08	13,5
EAMA 31 João XXIII		3,1	29/08	23,1	26/08	12,3
EAMA 41 PREMEN		2,4	28/08	21,5	26/08	10,6

A média da concentração diária de MP_{2,5} durante o mês de agosto é apresentada na Figura 8. Considerando os valores do padrão de qualidade do ar estabelecidos para o município de Itabira (DN CODEMA nº 2/2022) é possível verificar que não houve extrapolação para o período analisado.


Figura 8. Concentração ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) do $\text{MP}_{2,5}$ para as 4 estações de monitoramento em Itabira no mês de agosto de 2023.



Nas figuras a seguir (Figs. 9 a 12) são apresentadas as rosas de poluentes para o parâmetro $\text{MP}_{2,5}$ considerando os dados de direção e velocidade escalar do vento registrados em cada estação de monitoramento da qualidade do ar.


Na EAMA11 (Figura 9) as maiores concentrações de $MP_{2,5}$, estiveram associadas, principalmente, às direções na faixa sudoeste (SW) a sudeste (SSE). A direção lés-sudeste (ESE) foi a que obteve a maior frequência no mês, atingindo o valor de 35%.

Figura 9. Rosa de poluentes para o $MP_{2,5}$ na EAMA11 em agosto.




Na EAMA21 (Figura 10) as maiores concentrações de $MP_{2,5}$, estiveram associadas às direções sul-sudeste (SSE) e sul (S). A direção sul (S) foi a que obteve maior frequência no mês, atingindo o valor de 36%.

Figura 10. Rosa de poluentes para o $MP_{2,5}$ na EAMA21 em agosto.




Na EAMA31 (Figura 11), as maiores concentrações de $MP_{2,5}$, estiveram associadas às direções oeste (W) e sul-sudeste (SSE). A direção sul (S) foi a que obteve as maiores frequências no mês, atingindo o valor de 29%.

Figura 11. Rosa de poluentes para o $MP_{2,5}$ na EAMA31 em agosto.



Por fim, na EAMA41 (Figura 12), as maiores concentrações de $MP_{2,5}$ estiveram associadas às direções su-sudeste (SSE) e sul (S). A direção lés-sudeste (ESE) foi a que obteve a maior frequência no mês, atingindo o valor de 33%.

Figura 12. Rosa de poluentes para o $MP_{2,5}$ na EAMA41 em agosto.



ANÁLISE DOS POLUENTES MONITORADOS - MP₁₀

No mês de agosto de 2023, o parâmetro MP₁₀ apresentou maior registro na EAMA31, sendo o valor máximo observado de 76,9 µg/m³ no dia 25/08. Já a menor concentração para o período foi registrada na EAMA41, sendo igual a 6,6 µg/m³ no dia 17/08. No Quadro 4 apresenta-se um resumo dos valores das medições para o parâmetro MP₁₀ no período analisado. As maiores concentrações dos poluentes foram registradas no dia 25/08. Já as menores concentrações ocorreram nos dias 17, 27 e 28/08.


No dia 25/08 a pressão atmosférica e a umidade relativa média diária atingiram o menor valor para o mês, sendo que o menor valor de umidade relativa mínima diária foi no dia 03/08, como mencionado anteriormente. A baixa pressão propicia os movimentos ascendentes do ar, promovendo o levantamento e ressuspensão de poeira, e a baixa umidade promove a piora na qualidade do ar.

Quadro 4. Resumo das medições do parâmetro MP₁₀ para o mês de agosto de 2023.

Estação	Valor Limite PI - 1 (µg/m ³)	Mínimo		Máximo		Média Aritmética (µg/m ³)
		Valor (µg/m ³)	Data	Valor (µg/m ³)	Data	
EAMA 11 Vila Paciência	100	9,3	28/08	69,0	25/08	38,9
EAMA 21 Areão		7,3	27/08	63,5	25/08	33,7
EAMA 31 João XXIII		6,7	27/08	76,9	25/08	35,1
EAMA 41 PREMEN		6,6	17/08	56,7	25/08	27,8

A concentração média diária de MP_{10} durante o mês de agosto é apresentada na Figura 13, onde a linha vermelha representa o padrão de qualidade do ar intermediário adotado no município. Considerando os valores do padrão de qualidade do ar estabelecidos para o município de Itabira (DN CODEMA nº 2/2022) é possível verificar que não houve extrapolação para o período analisado.

Figura 13. Concentração ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) do MP_{10} para as 4 estações de monitoramento em Itabira no mês de agosto de 2023.



ANÁLISE DOS POLUENTES MONITORADOS - PTS

No mês de agosto de 2023, o parâmetro PTS apresentou valor máximo de 157,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ no dia 25/08 na EAMA31. A menor concentração para o período foi registrada na EAMA41, sendo igual a 6,6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ no dia 28/08. As maiores concentrações de PTS foram registradas nos dias 04 e 25/80. Já as menores concentrações ocorreram nos dias 27 e 28/08, quando houve o maior volume de chuva registrado no mês.


No Quadro 5 apresenta-se um resumo dos valores das medições para o parâmetro PTS no período analisado.

Quadro 5. Resumo das medições do parâmetro PTS para o mês de agosto de 2023.

Estação	Valor Limite PI - 1 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Mínimo		Máximo		Média Aritmética ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
		Valor ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Data	Valor ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Data	
EAMA 11 Vila Paciência	150	11,7	27/08	117,9	25/08	60,5
EAMA 21 Areão		7,6	27/08	121,7	25/08	60,0
EAMA 31 João XXIII		11,7	27/08	157,2	25/08	69,4
EAMA 41 PREMEN		6,6	28/08	109,3	04/08	58,1

Na Figura 14 são apresentadas as médias diárias para o parâmetro PTS registradas no período em análise. Considerando os valores do padrão de qualidade do ar estabelecidos para o município de Itabira (DN CODEMA nº 2/2022) é possível perceber que houve extrapolação para o período analisado, na estação EAMA31 no dia 25/08. Como mencionado anteriormente para o parâmetro MP₁₀, no dia 25/08 a pressão atmosférica e a umidade relativa média atingiram o menor valor para o mês, o que promoveu a piora na qualidade do ar. Pode-se notar que a EAMA41 não apresentou dados válidos nesse dia.

Figura 14. Concentração ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) do PTS para as 4 estações de monitoramento em Itabira no mês de agosto de 2023.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

14 de agosto: Dia do controle da poluição industrial

No dia 14 de agosto é comemorado o Dia Nacional de Controle da Poluição Industrial. O dia foi motivado pelo Decreto-Lei nº1.413, de 1975, o primeiro instrumento regulatório voltado ao controle ambiental do setor, principalmente em razão do agravamento da má qualidade do ar nas áreas industriais do Estado de São Paulo.

Essa data tem como principal objetivo refletir e motivar ações que diminuam o impacto negativo das indústrias no meio ambiente e na saúde pública. Em Itabira, essa data se torna importante para refletir sobre a qualidade do ar na cidade, que é diretamente influenciada pelas emissões de poluentes atmosféricos de origem veicular e industrial, com destaque para as emissões de poeira de minério de ferro (Figura 15).

Figura 15. Vista da cidade de Itabira com destaque para as emissões de poeira provenientes das atividades de mineração.



Fonte: Google Images

O Primeiro Inventário de Emissões Atmosféricas de Itabira verificou que, em dezembro de 2021, a cidade possuía cerca de 10.200 empreendimentos registrados, dos quais, cerca de 600 empresas contribuem com algum grau de poluição na cidade. Esses empreendimentos são comerciais e industriais, de extração de minerais, entre outros. Contudo, devido a dificuldades encontradas na obtenção de informações quanto ao consumo de combustíveis por parte das empresas de Itabira, o inventário apresentou as estimativas de emissões de poluentes resultantes do consumo total de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) do município (fontes comerciais, industriais e residenciais), além da estimativa das emissões evaporativas por abastecimento.

De acordo com o Inventário, a estimativa de emissão anual de material particulado total pela queima de GLP é de 151 toneladas. Contudo, o poluente mais emitido pela queima de GLP são os óxidos de nitrogênio com 2.838,9 toneladas. Na sequência, encontra-se a contribuição do monóxido de carbono com 1.588 toneladas, dos óxidos de enxofre com 288,6 e dos compostos orgânicos voláteis com 208 toneladas.

Portanto, é necessário que as empresas adotem medidas preventivas para reduzir o nível de poluição. Algumas estratégias podem envolver o uso de fontes renováveis de energia, o incentivo à reciclagem, reaproveitamento e descarte adequado dos resíduos. É urgente que as empresas promovam uma gestão mais sustentável. Isso trará inúmeros benefícios para a própria empresa e seus funcionários, além de contribuir para maior qualidade de vida dos itabiranos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução Nº 491 de 19 de novembro de 2018. Dispõe sobre os padrões de qualidade do ar.

]

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Agência do Estado de São Paulo responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição. Disponível em: <<https://cetesb.sp.gov.br/>>. Acesso em: 30 junho de 2023.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Dia de Combate à Poluição. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 2017. Disponível em: <<https://cetesb.sp.gov.br/blog/2017/08/14/dia-de-combate-a-poluicao>> Acesso em 12 de junho de 2023.

FREITAS, A. de M.; SOLCI, M. C. Caracterização do MP10 e MP2,5 e distribuição por tamanho de cloreto, nitrato e sulfato em atmosfera urbana e rural de Londrina. Química Nova, [S.L.], v. 32, n. 7, p. 1750-1754, 2009. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0100-40422009000700013>.

GOMES, E. L. M.; BIASUTTI, S. Avaliação do desempenho dos modelos de qualidade do ar AERMOD e CALPUFF na região de Anchieta-ES. Universidade Federal do Espírito Santo - Departamento de Engenharia Ambiental. Vitória, 2012. Disponível em: <https://ambiental.ufes.br/sites/ambiental.ufes.br/files/field/anexo/avaliacao_do_desempenho_dos_modelos_de_qualidade_do_ar_aermo_d_e_calpuff_na_regiao_de_anchieta-es.pdf>.

ITABIRA. Deliberação Normativa CODEMA nº 02, de 15 de agosto de 2022. Dispõe sobre a operacionalização da proteção ambiental no Município de Itabira, regulando as normas e padrões para a qualidade do ar.

KÖPPEN, 2022. Classificação climática de Köppen para os municípios brasileiros. Disponível em: <<https://koppenbrasil.github.io/>>. Acesso em: 16 de mar. de 2022.

VICENTINI, P. C. Uso de Modelos de Qualidade do ar para a Avaliação do Efeito do PROCONVE entre 2008 e 2020 na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. (Tese de Doutorado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ. p. 242. 2011. Disponível em: <http://objdig.ufrj.br/60/teses/coppe_d/PedroCaffaroVicentini.pdf>. Acesso em: 08 de mar. de 2022.